

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
АПИКС, 2,5 мг и 5 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
(апиксабан)

Важно носить с собой эту памятку на протяжении всего времени приёма лекарственного препарата АПИКС.

Показывайте эту памятку работникам аптеки, стоматологам и любым другим специалистам системы здравоохранения, к которым вы обращаетесь.

Информация для пациентов

- Регулярно принимайте лекарственный препарат АПИКС в соответствии с указаниями вашего лечащего врача. Если вы пропустили прием дозы препарата, примите ее, как только вспомните, а следующую дозу принимайте в обычное время. Далее продолжайте следовать своей схеме приема препарата.
- Не прекращайте прием препарата АПИКС, не посоветовавшись с врачом, так как в этом случае имеется риск развития инсульта и других осложнений.
- АПИКС помогает предотвратить образование тромбов. Однако данный лекарственный препарат может увеличивать риск кровотечения.
- Признаки и симптомы кровотечения включают появление синяков и подкожных кровоподтеков, стул черного цвета, кровь в моче, кровотечение из носа, головокружение, усталость, бледность или слабость, внезапную сильную головную боль, кашель с кровью или рвоту кровью.
- Если кровотечение не останавливается само по себе, **немедленно обратитесь за медицинской помощью.**
- Если Вам требуется операция или любая инвазивная процедура, сообщите своему лечащему врачу, что вы принимаете АПИКС.

Информация для медицинских работников

- АПИКС (апиксабан) – это пероральный антикоагулянт, действующий путем прямого селективного ингибирования фактора Ха.
- АПИКС может увеличивать риск кровотечения. В случае сильного кровотечения прием лекарственного препарата следует остановить немедленно.
- Лечение лекарственным препаратом АПИКС не требует непрерывного мониторинга экспозиции. В исключительных случаях прибегают к количественному анти-Ха-фактор тесту, например, при передозировке или при необходимости экстренного оперативного вмешательства (определение протромбинового времени, международного нормализованного отношения и активированного частичного тромбопластинового времени не рекомендуется) – см. общую характеристику лекарственного препарата АПИКС.
- Существует специфический антидот (андексанет альфа), способный нейтрализовать активность ингибитора фактора Ха апиксабана.

Заполните данный раздел или попросите об этом вашего лечащего врача

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ф.И.О. | |
| Дата рождения | |
| Показания к применению | |
| Доза препарата АПИКС | |
| Ф.И.О. лечащего врача | |
| Контактный телефон лечащего врача | |

